



Projet de valorisation viticole du coteau du Pseautier à CHARTEVES (02)

Note en réponse suite à la consultation du public

1) Absence de solution alternative

- **Points soulevés lors de la consultation**

Il conviendrait de développer l'argumentaire présenté dans le dossier initial, qui évoque la nécessité de respecter un certain nombre de critères pour le choix du site. Toutefois aucun autre site n'a été étudié. Par ailleurs, les observations reçues font état d'une production actuelle supérieure au quota fixé.

- **Éléments de réponse**

Le coteau du Pseautier à Chartèves est constitué de parcelles cadastrales classées en Appellation d'Origine Contrôlée Champagne définie par la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927 et reprise successivement par le décret du 29 juin 1936 et du 22 novembre 2010 modifié. Cette appellation est réglementée par un cahier des charges dont la zone de production des raisins est strictement définie par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Le classement de parcelles cadastrales en zone d'appellation est basé sur des critères techniques établis par cet organisme d'état, qui font référence principalement au sol, au sous-sol et à l'exposition des dites parcelles. Ces critères déterminent les caractéristiques spécifiques des parcelles classées qui par conséquent ne permettent pas la transposition vers d'autres terres agricoles.

Par ailleurs la réglementation communautaire (rglt UE n° 1308/2013, n° 2015/560 et n° 2015/561) et nationale (art D 665-1 à 665-15 du CPRM) encadre strictement la gestion du potentiel de production. Les exploitants, propriétaires sur le coteau, disposent actuellement de droits de plantation qui arriveront à échéance au 31 juillet 2023 après avoir bénéficié d'une 1ère prorogation du fait de la procédure de remembrement ouverte sur le périmètre en cause.

Toutes ces dispositions conduisent chaque propriétaire d'une parcelle classée sur le site à ne disposer d'aucune alternative géographique pour la mise en culture de vignes.

➤ *Ces éléments viennent compléter la partie B - 1.2 du rapport (mai 2019 - version 2.2)*



2) Intérêt public majeur

- **Points soulevés lors de la consultation**

Il conviendrait également de développer ce point dans un mémoire en réponse. En effet, les observations recueillies remettent en cause les informations présentées en termes de création d'emplois. Il est également avancé que les nuisances, pollutions et risques pouvant être générées par le projet ne sont pas considérées et que l'intérêt du coteau est supérieur à l'intérêt du projet. Enfin, l'argument de la production supérieure au quota est également repris.

- **Éléments de réponse**

Le projet repose sur la mise en œuvre de deux décisions préfectorales en date du 13 juillet 2001, placées en annexe :

- Arrêté Préfectoral ordonnant le remembrement rural dans la commune de Chartèves,
- Arrêté Préfectoral d'agrément de la réserve naturelle volontaire du coteau de Chartèves.

Il convient de noter que ce deuxième arrêté rassemble des contributions en surface apportées par des propriétaires privés et la commune de Chartèves.

En effet, le développement de la végétation sur le coteau (ourlets, fourrés, puis bois) conduit de manière irréversible le coteau à se banaliser et à éteindre progressivement les différentes espèces encore présentes sur ces espaces.

Tandis que, sur la base d'un protocole d'accord multi-acteurs signé en 1995, le projet met en œuvre une solution pour stabiliser, développer, la valeur écologique du coteau et favoriser le retour d'une activité anthropique. Cette mise en culture de vignes, réfléchies et sous des pratiques durables, garantit un modèle économique propice à la restauration et à l'entretien de ces milieux de manière pérenne.

C'est pourquoi également, des discussions sont ouvertes avec la Région Hauts de France pour examiner la création d'une réserve naturelle régionale au cœur du projet.

Le vignoble de Champagne est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de Viticulture Durable qui conduit à une certification des exploitations. Le choix des propriétaires exploitants du coteau de Chartèves est de s'imposer ce mode d'exploitation sur l'intégralité du coteau (en pièce jointe la dernière version en vigueur du cahier des charges VDC). De plus l'aménagement de celui-ci sera réalisé dans l'esprit et le respect de ce qui a conduit au classement du vignoble au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Enfin, l'activité viticole qui se développera sur la commune contribuera au tissu économique et social local comme à celui de la filière Champagne et par voie de conséquence à celui de l'Etat.

➤ *Ces éléments viennent compléter la partie B - 1.1 du rapport (mai 2019 - version 2.2)*



3) Etat initial

- **Points soulevés lors de la consultation**

Il conviendrait d'intégrer deux espèces protégées menacées dont la présence est connue sur le coteau : Torcol fourmilier (dernière observation en 2016) et Orchis musc (dernière observation en 2000).

- **Eléments de réponse**

Le Torcol fourmilier figure bien dans la liste des espèces d'avifaune potentielles sur la zone d'étude (cortège de l'avifaune des milieux ouverts et semi-ouverts) (Cf. tableau de bioévaluation en page suivante).

L'Orchis musc est une espèce protégée en Picardie. Cité dans les études précédentes, ce taxon n'a pas été observé lors des prospections de 2017. Sur Digitale 2, commune de Chartèves, la donnée d'*Herminium monorchis* date de Juin 2001. La fermeture du coteau n'est certainement pas favorable à son développement, mais cette espèce est sujette à des phénomènes d'éclipse, et il est très difficile de la voir (encore plus en 2017 où les conditions climatiques étaient défavorables). Dans ces conditions, **l'Orchis musc doit en effet être considérée comme encore potentiellement présente sur l'aire d'étude**. Notons qu'il s'agit, outre son statut d'espèce protégée, d'un taxon à très fort enjeu : très rare (RR) dans les HdF, EN (en danger) sur la liste rouge régionale et VU (vulnérable) sur la liste rouge nationale.

➤ *Ces éléments viennent compléter les parties A - 4.1 et 4.2 du rapport (mai 2019 - version 2.2)*

| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Prot. | Liste rouge | | | | Rareté régionale | Déterm. ZNIEFF | Dir. Oiseaux | Conv. Berne | Période d'observation sur la zone projet | | |
|--|--------------------------|-------|-------------|------|------|---------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|--|-------------|-----------|
| | | | nat. | rég. | hiv. | passage | | | | | Nidification | Migratoire | Hivernale |
| Avifaune observée en période de reproduction | | | | | | | | | | | | | |
| Avifaune des milieux boisés | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Bouvreuil pivoine | Nat. | VU | LC | NA | NE | C | | | Ann. III | Nicheur possible | X | X |
| <i>Dendrocopos medius</i> | Pic mar | Nat. | LC | LC | | | PC | nich | Ann. I | Ann. II | A prox. | | |
| <i>Dryocopus martius</i> | Pic noir | Nat. | LC | NT | NE | NE | | nich | Ann. I | Ann. II | A prox. | X | X |
| <i>Parus montanus</i> | Mésange boréale | Nat. | VU | LC | | | AC | | | Ann. II | A prox. | | |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Pouillot siffleur | Nat. | NT | VU | | | AR | | | Ann. II | A prox. | | |
| <i>Milvus migrans</i> | Milan noir | Nat. | LC | CR | | | TR | nich | Ann. I | Ann. II | A prox. | | |
| <i>Asio otus</i> | Hibou moyen-duc | Nat. | LC | DD | | | AC | | | Ann. II | Nicheur possible | | |
| <i>Ardea cinerea</i> | Héron cendré | Nat. | LC | LC | | | AC | nich | | Ann. III | A prox. | | |
| <i>Buteo buteo</i> | Buse variable | Nat. | LC | LC | NA | NA | C | | | Ann. II | Nicheur possible | X | X |
| <i>Certhia brachydactyla</i> | Grimpereau des jardins | Nat. | LC | LC | NE | NE | C | | | Ann. II | Nicheur possible | X | X |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Grosbec casse-noyaux | Nat. | LC | LC | NA | NE | AC | | | Ann. II | A prox. | X | |
| <i>Columba palumbus</i> | Pigeon ramier | | LC | LC | LC | NA | TC | | | | Nicheur probable | X | X |
| <i>Corvus corone corone</i> | Cornille noire | | LC | LC | NA | NE | TC | | | | Nicheur possible | X | X |
| <i>Dendrocopos major</i> | Pic épeiche | Nat. | LC | LC | NA | NE | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | X |
| <i>Fringilla coelebs</i> | Pinson des arbres | Nat. | LC | LC | NA | NA | TC | | | Ann. III | Nicheur probable | X | X |
| <i>Garrulus glandarius</i> | Geai des chênes | | LC | NA | NA | NE | C | | | | Nicheur possible | X | X |
| <i>Phylloscopus collybita</i> | Pouillot véloce | Nat. | LC | LC | NA | LC | TC | | | Ann. II | Nicheur probable | X | |
| <i>Pica pica</i> | Pic bavarde | | LC | LC | NE | NE | C | | | | Nicheur possible | X | X |
| <i>Picus viridis</i> | Pic vert | Nat. | LC | LC | NE | NE | C | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Regulus ignicapillus</i> | Roitelet triplebandeau | Nat. | LC | LC | NA | NA | AC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Sitta europaea</i> | Sittelle torchepot | Nat. | LC | LC | NE | NE | C | | | Ann. II | Nicheur possible | X | X |
| <i>Sturnus vulgaris</i> | Étourneau sansonnet | | LC | LC | NE | NA | CC | | | | Nicheur possible | X | X |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | Troglodyte mignon | Nat. | LC | LC | NE | NE | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | X |
| <i>Pernis apivorus</i> | Bondrée apivore | Nat. | LC | NT | AC | NE | LC | nich | Ann. I | Ann. II | Potentielle | Potentielle | |
| Avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lanius collurio</i> | Pie-grièche écorcheur | Nat. | NT | LC | | | PC | nich | Ann. I | Ann. II | Nicheur probable | | |
| <i>Carduelis cannabina</i> | Linotte mélodieuse | Nat. | VU | LC | NA | NA | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Carduelis chloris</i> | Verdier d'Europe | Nat. | VU | LC | NE | NE | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Emberiza citrinella</i> | Bruant jaune | Nat. | VU | LC | | | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | | |
| <i>Locustella naevia</i> | Locustelle tachetée | Nat. | NT | LC | NE | NA | AC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> | Pouillot fitis | Nat. | NT | LC | DD | LC | | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Sylvia borin</i> | Fauvette des jardins | Nat. | NT | LC | | | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | | |
| <i>Anthus trivialis</i> | Pipit des arbres | Nat. | LC | LC | NE | DD | C | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Aegithalos caedatus</i> | Mésange à longue queue | Nat. | LC | LC | NE | NA | TC | | | Ann. III | Nicheur possible | X | |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> | Mésange bleue | Nat. | LC | LC | NE | NA | TC | | | | Nicheur probable | X | X |
| <i>Parus major</i> | Mésange charbonnière | Nat. | LC | LC | NA | NA | TC | | | Ann. II | Nicheur certain | X | X |
| <i>Phasianus colchicus</i> | Faisan de Colchide | | LC | LC | | | C | | | Ann. III | Nicheur possible | | |
| <i>Prunella modularis</i> | Accenteur mouchet | Nat. | LC | LC | NA | NE | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Sylvia communis</i> | Fauvette grisette | Nat. | LC | LC | | | TC | | | Ann. II | Nicheur probable | | |
| <i>Sylvia curruca</i> | Fauvette babillarde | Nat. | LC | LC | NE | NA | C | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Sylvia atricapilla</i> | Fauvette à tête noire | Nat. | LC | LC | NA | NA | TC | | | Ann. II | Nicheur probable | X | |
| <i>Turdus merula</i> | Merle noir | | LC | LC | NA | NA | TC | | | Ann. III | Nicheur certain | X | X |
| <i>Turdus philomelos</i> | Grive musicienne | | LC | LC | NA | NA | TC | | | Ann. III | Nicheur possible | X | |
| <i>Emberiza cirius</i> | Bruant zizi | Nat. | LC | NE | AR | NE | NE | nich | | Ann. II | Potentielle | Potentielle | |
| <i>Jynx torquilla</i> | Torcol fourmillier | Nat. | LC | EN | | NE | NE | nich | | Ann. II | Potentielle | Potentielle | |
| <i>Circus cyaneus</i> | Busard Saint-Martin | Nat. | LC | NT | NA | NA | PC | nich;hiv (10 (dortoir)) | Ann. I | Ann. II | Potentielle | Potentielle | |
| <i>Lanius excubitor</i> | Pie-grièche grise | Nat. | EN | CR | NA | NE | R | nich | | Ann. II | Potentielle | Potentielle | |
| <i>Saxicola torquata</i> | Tarier pâle | Nat. | NT | NT | NA | NA | C | | | Ann. III | Potentielle | Potentielle | |
| <i>Passer montanus</i> | Moineau friquet | Nat. | EN | VU | NE | NE | AC | | | Ann. III | Potentielle | Potentielle | |
| Avifaune des zones urbanisées | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Delichon urbica</i> | Hirondelle de fenêtre | Nat. | NT | LC | NE | DD | TC | | | Ann. II | Nicheur à prox. | X | |
| <i>Hirundo rustica</i> | Hirondelle rustique | Nat. | NT | LC | | | TC | | | Ann. II | Nicheur à prox. | | |
| <i>Passer domesticus</i> | Moineau domestique | Nat. | LC | LC | | | TC | | | | Nicheur à prox. | | X |
| <i>Phoenicurus ochruros</i> | Rougequeue noir | Nat. | LC | LC | NA | NA | TC | | | Ann. II | Nicheur possible | X | |
| <i>Streptopelia decaocto</i> | Tourterelle turque | | LC | LC | NE | NA | TC | | | Ann. III | Nicheur possible | X | X |
| Avifaune observée uniquement en période migratoire et hivernale | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Accipiter gentilis</i> | Autour des palombes | Nat. | LC | VU | NA | NA | R | nich | | Ann. II | Potentielle | X | |
| <i>Falco peregrinus</i> | Faucon pèlerin | Nat. | | | NA | NA | E | | Ann. I | Ann. II | | X | |
| <i>Lullula arborea</i> | Alouette lulu | Nat. | | | NA | NE | AR | nich | | Ann. III | | X | |
| <i>Milvus milvus</i> | Milan royal | Nat. | | | NE | NE | TR | nich,hiv (1) | Ann. I | Ann. II | | X | |
| <i>Phalacrocorax carbo</i> | Grand cormoran | Nat. | | | LC | NA | AR | nich, hiv (30) | | Ann. III | | X | |
| <i>Saxicola rubetra</i> | Tarier des prés | Nat. | | | NE | DD | AR | nich | | Ann. II | | X | |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Rougequeue à front blanc | Nat. | | | NE | NE | PC | nich | | Ann. II | | X | |
| <i>Accipiter nisus</i> | Epervier d'Europe | Nat. | | | NA | NA | AC | | | Ann. II | | X | |
| <i>Alauda arvensis</i> | Alouette des champs | | | | LC | NA | TC | | | Ann. III | | X | |
| <i>Anthus pratensis</i> | Pipit farlouse | Nat. | | | DD | NA | C | | | Ann. II | | X | |
| <i>Carduelis carduelis</i> | Chardonneret élégant | Nat. | | | NA | NA | TC | | | Ann. II | | X | X |
| <i>Corvus monedula</i> | Choucas des tours | Nat. | | | NA | NE | AC | | | | | X | |
| <i>Cygnus olor</i> | Cygne tuberculé | Nat. | | | NA | NE | AC | nich;hiv (25) | | Ann. II | | X | |
| <i>Eritacus rubecula</i> | Rougegorge familier | Nat. | | | NA | NA | TC | | | Ann. II | | X | X |
| <i>Falco tinnunculus</i> | Faucon crécerelle | Nat. | | | NA | NA | C | | | Ann. II | | X | X |
| <i>Motacilla alba</i> | Bergeronnette grise | Nat. | | | NA | NE | TC | | | Ann. II | | X | |
| <i>Parus cristatus</i> | Mésange huppée | Nat. | | | NE | NE | AC | | | Ann. II | | X | |
| <i>Parus palustris</i> | Mésange nonnette | Nat. | | | NE | NE | C | | | Ann. II | | X | X |
| <i>Turdus iliacus</i> | Grive mauvis | | | | LC | NA | | | | Ann. III | | X | |
| <i>Turdus viscivorus</i> | Grive draine | | | | NA | NA | C | | | Ann. III | | X | X |
| <i>Tyto alba</i> | Effraie des clochers | Nat. | | | NE | NE | AC | | | Ann. II | | X | |
| <i>Scolopax rusticola</i> | Bécasse des bois | | | | LC | NA | | nich | | Ann. III | | | X |

Légende :

Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France et en Picardie

EN= en danger, VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, NA= non applicable, Loc. = Localisé

Rareté régionale des oiseaux nicheurs :

RR= très rare, AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= commun, CC= très commun, I= indéterminé

En marron : espèce potentielle

| Code couleur | Niveau d'enjeu |
|--------------|----------------|
| | Fort |
| | Moyen |
| | Faible à moyen |
| | Faible |